


## Integrali doppi su domini ellittici

EffeDiX può determinare **approssimazioni numeriche** di integrali doppi su domini ellittici o su settori di dominio ellittico; tali domini sono individuati da ellissi di equazione

$$(x-m)^2/a^2 + (y-n)^2/b^2 = 1$$

con  $(m, n)$  coordinate del centro dell'ellisse e  $a$  e  $b$  rispettivamente le misure dell'asse orizzontale e dell'asse verticale dell'ellisse. I settori ellittici sono individuati dagli angoli  $\theta_1$  e  $\theta_2$  in figura.



E' inoltre possibile tracciare i settori ellittici su cui gli integrali sono definiti e il relativo arco di ellisse o l'intera ellisse. L'opzione da utilizzare è: *Calcolo – Integrale doppio – Su dominio ellittico*.

L'algoritmo utilizzato è la quadratura di Gauss-Legendre con 100 nodi e fornisce valori accuratissimi quando le funzioni che intervengono nel calcolo sono di classe  $C^1$  e non fortemente oscillanti; in questo caso tutte le cifre fornite da EffeDiX sono attendibili anche quando è attiva l'opzione *Più accuratezza*. L'accuratezza è ancora molto buona per funzioni che non siano di classe  $C^1$ , in questo caso però non si dovrebbe utilizzare l'opzione *Più accuratezza*. E' importante verificare che la funzione integranda  $h(x, y)$  sia definita su tutto il dominio d'integrazione, in caso contrario il risultato fornito potrebbe non essere attendibile.

Esaminiamo alcuni esempi.

### Esempio 1

Calcolare l'integrale

$$\iint_D x^2 y \, dx \, dy$$

dove  $D$  è l'insieme dei punti  $(x, y)$  di  $\mathbb{R}^2$  tali che

$$(x-1)^2 + (y-2)^2/4 \leq 1$$

La figura seguente mostra la finestra di impostazione e il risultato.

**e<sup>x</sup>** Integrale doppio su dominio ellittico
✕

Definizione dominio D d'integrazione (dominio ellittico o settore di dominio ellittico)

Settore ellittico individuato dall'ellisse di equazione  
 $(x - m)^2 / a^2 + (y - n)^2 / b^2 = 1$   
 e dagli angoli  $\theta_1$  e  $\theta_2$  in figura.  
 Ad es. per tutto il dominio ellittico porre  $\theta_1 = 0, \theta_2 = 2\pi$ .

m = ascissa del centro =


n = ordinata del centro =

a = semiasse orizzontale =

b = semiasse verticale =

$\theta_1 =$         $\theta_2 =$

[Traccia il dominio](#)   [Traccia l'arco di ellisse](#)   [Traccia l'ellisse](#)



Funzione h(x,y) da integrare sul dominio D

h(x,y)=

Più accuratezza [Guida](#)


$$\iint_D h(x,y) dx dy =$$

Attenzione: se la funzione h(x,y) non è definita in punti del dominio D, i valori forniti potrebbero non essere attendibili

Il risultato fornito da EffeDiX è 15,70796327 e si legge in basso nella parte grigia a sola lettura della finestra; l'ultima cifra viene, come al solito, arrotondata. Il risultato simbolico è

$$5\pi \approx 15,70796327$$

Non mettendo la spunta sull'opzione *Più accuratezza* il risultato approssimato sarebbe stato 15,708. Per tracciare il dominio e l'ellisse in figura, utilizzare le opzioni *Traccia il dominio* e *Traccia l'ellisse* che trovate nella stessa finestra di impostazione; poiché tali opzioni interagiscono con la finestra principale è opportuno non massimizzare quest'ultima in modo che tutte le finestre aperte restino in primo piano (comunque potete sempre richiamare l'ultima finestra aperta facendo clic sul pulsante in alto a destra della finestra principale).



## Esempio 2

Calcolare l'integrale


$$\iint_D (x - y^2) dx dy$$

dove  $D$  è l'insieme dei punti  $(x, y)$  di  $\mathbb{R}^2$  tali che siano verificate simultaneamente le seguenti disequazioni

$$(x-1)^2/4 + (y-2)^2 \leq 1$$

$$x+1 \leq y \leq \sqrt{3}x - \sqrt{3} + 2$$

I due angoli che individuano il settore ellittico si ricavano dai coefficienti angolari delle due rette e sono evidentemente  $\theta_1 = \text{atan}(1) = \pi/4$  e  $\theta_2 = \text{atan}(\sqrt{3}) = \pi/3$ . La figura seguente mostra la finestra di impostazione.



Integrale doppio su dominio ellittico
✕

---

Definizione dominio D d'integrazione (dominio ellittico o settore di dominio ellittico)

Settore ellittico individuato dall'ellisse di equazione  $(x - m)^2 / a^2 + (y - n)^2 / b^2 = 1$  e dagli angoli  $\theta_1$  e  $\theta_2$  in figura. Ad es. per tutto il dominio ellittico porre  $\theta_1 = 0, \theta_2 = 2\pi$ .

m = ascissa del centro =

n = ordinata del centro =

a = semiasse orizzontale =

b = semiasse verticale =

$\theta_1 =$        $\theta_2 =$

[Traccia il dominio](#)    [Traccia l'arco di ellisse](#)    [Traccia l'ellisse](#)

---

Funzione  $h(x,y)$  da integrare sul dominio D

$h(x,y) =$

Più accuratezza
 [Guida](#)
OK

---

$$\iint_D h(x,y) dx dy =$$

Attenzione: se la funzione  $h(x,y)$  non è definita in punti del dominio D, i valori forniti potrebbero non essere attendibili

Il valore simbolico dell'integrale fornito da SageMath è:

$$\frac{8}{39} \sqrt{13} (\sqrt{3} + 1) - \frac{16}{15} \sqrt{5} + \frac{13}{4} \text{ATAN}(2) - \frac{13}{4} \text{ATAN}(2 \sqrt{3}) - \frac{1}{8} \text{SIN}(2 \text{ATAN}(2)) + \frac{1}{8} \text{SIN}(2 \text{ATAN}(2 \sqrt{3})) \approx -0,99138764$$

### Esempio 3

Calcolare l'integrale

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

dove  $D$  è l'insieme dei punti  $(x, y)$  di  $\mathbb{R}^2$  tali che siano verificate simultaneamente le seguenti disequazioni

$$\begin{aligned} x^2/4 + y^2 &\leq 1 \\ 0 &\leq y \leq x \end{aligned}$$

Calcolarlo nei seguenti tre modi:

- 1) Mediante l'opzione *Integrale doppio - Su dominio ellittico*
- 2) Mediante l'opzione *Integrale forma differenziale* (applicando il teorema di Gauss-Green)
- 3) Mediante l'opzione *Integrale di flusso* (applicando il teorema della divergenza)


#### Primo modo

I dati da inserire sono evidentemente:

$$m=0, n=0, a=2, b=1, \theta_1=0, \theta_2=\pi/4$$

Segue la finestra di impostazione. Il risultato fornito da EffeDiX è 1,6839359, il risultato simbolico è

$$\begin{aligned} &5/4 \text{atan}(2) + 3/8 \sin(2 * \text{atan}(2)) \\ &\approx 1,6839359 \end{aligned}$$



**e<sup>x</sup>** Integrale doppio su dominio ellittico
✕

---

Definizione dominio D d'integrazione (dominio ellittico o settore di dominio ellittico)

Settore ellittico individuato dall'ellisse di equazione  
 $(x - m)^2 / a^2 + (y - n)^2 / b^2 = 1$   
 e dagli angoli  $\theta_1$  e  $\theta_2$  in figura.  
 Ad es. per tutto il dominio ellittico porre  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = 2\pi$ .


m = ascissa del centro =

n = ordinata del centro =

a = semiasse orizzontale =

b = semiasse verticale =

$\theta_1 =$         $\theta_2 =$



[Traccia il dominio](#)   [Traccia l'arco di ellisse](#)   [Traccia l'ellisse](#)

---

Funzione h(x,y) da integrare sul dominio D

h(x,y)=

Più accuratezza

[Guida](#)  

---

$$\iint_D h(x,y) dx dy =$$

Attenzione: se la funzione h(x,y) non è definita in punti del dominio D, i valori forniti potrebbero non essere attendibili

### Secondo modo

Il teorema di Gauss-Green ci permette di esprimere l'integrale di una forma differenziale lungo una curva chiusa  $\gamma$  mediante un integrale doppio esteso alla regione di piano  $D$  la cui frontiera è  $\gamma$ :


$$\oint_{\gamma} A dx + B dy = \iint_D \left( \frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy$$

Noi dobbiamo integrare la funzione  $x^2 + y^2$  sul dominio  $D$ ; ponendo  $A = -y^3/3$  e  $B = x^3/3$ , si ha


$$x^2 + y^2 = \partial B / \partial x - \partial A / \partial y$$

Quindi

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \oint_{\gamma} -y^3/3 dx + x^3/3 dy$$



dove  $\gamma$  è la curva chiusa in figura, percorsa in senso antiorario. In figura è anche stato tracciato il campo di direzioni associato alla forma differenziale; notare che sui tratti da B a C e da C ad A i vettori del campo sono ortogonali al versore tangente, ne segue che su questi tratti l'integrale di linea sarà nullo. Resta quindi da calcolare solo l'integrale della forma differenziale lungo l'arco di ellisse (vedi figura seguente).



Attenzione alla parametrizzazione dell'arco di ellisse, dobbiamo determinare l'intervallo di variazione di  $t$ ; per  $t=0$  siamo nel punto A e siamo in B quando  $B=(2\sqrt{5}/5, 2\sqrt{5}/5)$  coincide col punto  $(2\cos t, \sin t)$  cioè quando  $t=\arccos(\sqrt{5}/5)$ .

### Terzo modo

Una delle forme del teorema di Gauss-Green è, sotto opportune ipotesi, la seguente

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \iint_D \operatorname{div}(\vec{F}) \, dx dy$$

dove al primo membro compare un integrale di flusso,  $\vec{F}=(A(x,y), B(x,y))$  è un campo vettoriale,  $\gamma$  è una curva chiusa percorsa in modo da lasciare a sinistra il

suo interno e  $D$  è la regione di piano che ha  $\gamma$  per frontiera. Ricordiamo inoltre che la divergenza di un campo vettoriale è data da

$$\operatorname{div}(\vec{F}) = \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y}$$


Noi dobbiamo integrare la funzione  $x^2+y^2$  sul dominio  $D$ ; ponendo  $A=x^3/3$ ,  $B=y^3/3$ , si ha

$$x^2+y^2 = \partial A/\partial x + \partial B/\partial y$$

Quindi, posto  $\vec{F} = (A, B)$ , si ha

$$\iint_D (x^2+y^2) dx dy = \oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

dove  $\gamma$  è la curva chiusa in figura, percorsa in senso antiorario. In figura è anche stato tracciato il campo di direzioni associato al campo vettoriale  $\vec{F}$ ; notare che sui tratti da B a C e da C ad A i vettori del campo sono ortogonali al versore  $\vec{n}$  normale alla curva, ne segue che su questi tratti l'integrale di flusso sarà nullo. Resta quindi da calcolare solo l'integrale di flusso lungo l'arco di ellisse (vedi ultima figura).




**e<sup>x</sup>** Integrale di flusso attraverso una curva
✕

Curva  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$  con  $t \in [a, b]$

a =       b =

x(t) =

y(t) =



[Traccia la curva  \$\gamma\$](#)      
 [Traccia il vettore tangente a  \$\gamma\$](#)      
 [Traccia un punto dinamico su  \$\gamma\$](#)

Orientamento vettore normale

Orario (standard)   
  Antiorario

Il vettore normale si può ottenere per rotazione oraria o antioraria di  $90^\circ$  del vettore tangente. Nel primo caso si ha l'orientamento standard del vettore normale.

[Traccia il vettore normale su  \$\gamma\$](#)

Campo vettoriale  $F(x,y) = (A(x,y), B(x,y))$

A(x, y) =

B(x, y) =

[Traccia il campo vettoriale \(A, B\) su  \$\gamma\$](#)      
 [Traccia il campo vettoriale \(A, B\) su  \$R^2\$](#)

Più accuratezza
 [Guida](#)

$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds =$

Attenzione alla parametrizzazione dell'arco di ellisse, dobbiamo determinare l'intervallo di variazione di  $t$ ; per  $t=0$  siamo nel punto A e siamo in B quando  $B=(2\sqrt{5}/5, 2\sqrt{5}/5)$  coincide col punto  $(2\cos t, \sin t)$  cioè quando  $t=\arccos(\sqrt{5}/5)$ .